経腸栄養剤　一覧(100mlあたり)

容量に応じた計算表はこちら(リンク)

※容量あたりのため、濃度の濃い(2kcal/mlなど)栄養剤の場合、数値が見かけ上多く見えますのでご注意ください(グレー色付けのセル)。

		半消化態栄養剤													消化態栄養剤		成分栄養	
製品名		アイソカル	F2ショット	CZ-Hi	グルセルナ	メイン	テルミール2.0α	リーナレンpro1.0	プルモケア	オキシーパ	ラコール(薬)	エンシュアリキッド	エンシュアH(薬)	エネーボ(薬)	ペプチーノ	ヘプタメンAF	エレンタール(薬)	食事基準
包装単位	mL	200	200	400	400	200	200	250	250	250	200or400	250	250	250	200	200	粉末	
熱量	kcal	100	100	100	100	100	200	160	150	150	100	100	150	120	100	150	100	2100
蛋白質	g	3.3	4.0	5.0	4.2	5.0	7.2	1.6	6.2	6.3	4.4	3.5	5.3	5.4	3.6	9.5	4.4	60.0
脂質	g	4.2	2.2	2.2	5.6	2.8	7.6	4.5	9.2	9.4	2.2	3.5	5.3	3.8	0.0	6.6	0.2	46～57
炭水化物	g	12.0	16.8	14.7	9.7	13.3	26.0	27.9	10.5	10.6	15.6	13.7	20.6	18.4	21.4	13.2	21.1	
ビタミンA	μgRE	55	85	75	104	150	30	96	223	225	62	75	75	76	170	150	65	850
ビタミンD	μg	0.45	0.55	0.50	0.85	0.75	0.42	0.21	1.05	1.04	0.34	0.50	0.50	1.08	1.10	1.40	0.40	6
ビタミンB1	mg	0.13	0.21	0.16	0.12	0.25	0.19	0.21	0.46	0.32	0.38	0.15	0.23	0.20	0.50	0.38	0.06	1.30
ビタミンB2	mg	0.16	0.24	0.18	0.18	0.30	0.20	0.24	0.46	0.36	2.50	0.17	0.26	0.32	0.25	0.50	0.09	1.50
ビタミンB6	mg	0.16	0.50	0.30	0.21	0.30	0.27	0.67	0.50	0.43	0.38	0.20	0.30	0.31	0.25	0.65	0.09	1.40
ナイアシン	mg	1.9	2.3	3.2	1.7	4.0	2.9	2.7	4.6	2.9	2.5	2.0	3.0	1.8	2.5	8.0	0.7	14.0
パントテン酸	mg	0.75	0.90	1.00	0.70	1.20	0.85	0.67	2.08	1.30	0.96	0.50	0.75	1.00	1.20	6.00	0.40	6.00
葉酸	μg	20	50	30	20	50	30	130	60	40	37.5	20	30	27.6	50	46	14	240
ビタミンB12	μg	0.1	2.0	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	1.0	0.6	0.3	0.6	0.9	0.3	0.6	1.2	0.2	2.4
ビタミンC	mg	17	15	10	11	50	30	8	32	84	28	15	23	25	50	40	3	100
ビタミンK	μg	6	8	8	3	3	15	5	5	4	63	7	11	12	15	3	3	75
ビタミンE	mg	0.6	3.0	1.2	4.0	5.0	2.1	2.1	5.7	21.0	0.7	3.0	4.5	4.4	1.4	1.5	1.0	7.0
ビオチン	μg		6.50	5.00	4.00	7.50		1.55	6.50	6.00	3.9	15.2	22.8	5.2	12.5	16.0	13.0	50.00
Na	mg	50	136	90	94	70	100	48	130	131	74	80	120	92	70	120	87	600
食塩相当量	g	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	
Cl	mg	100	150	130	100	80	100	12	150	169	117	136	204	100	105	81	172	
K	mg	130	129	150	100	80	100	48	174	196	138	148	224	120	77	232	73	2500
K(換算)	mEq	3.3	3.3	3.8	2.6	2.1	2.6	1.2	4.5	5.0	3.5	3.8	5.7	3.1	2.0	5.9	1.9	
S	mg		15.0								0.0	0.0	0.0	0.0	30		0.0	
Mg	mg	26	35	38	21	20	38	24	36	21	19	20	30	20	18	31	13	350
Ca	mg	63	60	75	70	80	75	48	96	71	44	52	80	116	75	101	53	700
P	mg	50	75	75	65	70	100	32	96	67	44	52	80	100	40	85	41	1000
Fe	mg	0.6	1.0	1.1	1.4	1.0	1.5	1.4	2.1	1.3	0.6	0.9	1.4	1.8	0.7	1.6	0.6	7.5
Cu	μg	70	100	100	160	50	115	80	208	220	125	100	152	192	100	150	70	900
Zn	mg	0.7	1.0	1.1	1.2	1.0	1.4	1.2	1.7	1.8	0.6	1.5	2.3	1.8	1.2	2.2	0.6	12.0
Mn	μg	10	400	180		175	290	10			133	200	200	600		750	100	4000
Se	μg	3	6	4	2	5	7		3	2	3	0	0	8	1	6	0	30
Cr	μg	1	6	4	1	3					0	0	0	12	1	9	0	35
I	μg	1	15	15		10		1			0	0	0	0		45	5	95
Mo	μg	1	6	12	3	3		1			0	0	0	13	4	24	0	25
NPC/N		167	134	100	126	102	150	613	128	128	120	157	157	116	0	74	128	
水分	g	86.5	77.0	84.0	85.0	84.4	70.0	75.8	78.6	78.6	85.0	85.0	78.0	81.2	85	77.5	73.3	
食物繊維	g	0.6	1.5	2.0	0.9	1.2		1.6			0.0	0.0	0.0	1.9		0.0	0.0	10g/1000
n－6/n－3			4.0	3.3	3.0	2.0	4.0	4.0	5.0	1.6						1.8		
浸透圧	mOsm/L	280		300	560	600	450	720	384	384	330-360	330	540	350	500	440	760	
REF-P1でのトロミ付け		可	不要	可	可	可	可	不可	可	可	可	不可	可	可	可	可	可	
製品の特徴		体液と等張。乳糖不耐症にも安心。MCT配合。	とろみつき流動食。食物繊維配合。ビタミン微量元素を配合。	総合栄養食品。微量元素への配慮。MCT、EPA、DHAを配合。	脂肪・炭水化物調整栄養食品。食後高血糖に配慮すべき方に適する。	ホエイペプチド、n-3系脂肪酸配合。MCT、Lカルニチン配合。フルーツフレーバー	2kcal/1ml。微量元素への配慮。飲みやすいストロベリー風味。	1.6kcal/1ml。トロミをつける際はトロメイクを使用。腎機能の低下した状態に適したミネラル組成。	脂肪・炭水化物調整栄養食品。慢性閉塞性肺疾患患者に適している。	EPA、GLAを配合し、抗酸化ビタミンを強化。低糖質。アルギニンを強化していな	薬のため処方が必要	薬のため処方が必要 トロミをつける際はトロメイクを使用 バニラ・コーヒー	薬のため処方が必要 コーヒー・バナナ	薬のため処方が必要	脂肪・食物繊維が0gの消化態栄養剤で、吸収されやすい	消化態栄養剤。高蛋白質。EPA・DHA,MCT配合。	薬のため処方が必要	日本人の食事摂取基準(2010) 50-69歳男

【慢性腎臓病に対する食事療法基準 2014 年版(リンク)】

透析患者、CKD(ステージ3b)患者	2000mg/日以下	51.3mEq/日以下
CKD(ステージ4・5)患者	1500mg/日以下	38.5mEq/日以下

【その他K含有食品(リンク)】

【カリウム製剤(リンク)】

KCL注20mEq20mL	780mg/本	20mEq/本	アスパラカリウム散50%	114mg/g	2.9mEq/g
アスパラギン酸カリウム10mEq10mL	390mg/本	10mEq/本	アスパラカリウム錠300mg	69mg/錠	1.8mEq/錠
			スローケー錠600mg	315mg/錠	8mEq/錠