

## ○膵臓がん

### 【GEM 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,8,15

### 【TS-1 + GEM 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,15
TS-1（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム）	80-120mg/day	経口分 2	Day1-14

### 【GEM + タルセバ療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,8,15
タルセバ（エルロチニブ）	100mg/day	経口分 1	Day1-28

### 【mFOLFIRINOX 療法】 インターバル：14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エルプラット（オキサリプラチン）	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1
レボホリナート（レボホリナート）	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1
イリノテカン（イリノテカン）	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1
5-FU（フルオロウラシル）	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	Day1

### 【nab-PAC + GEM 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アブラキサン（パクリタキセル）	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,8,15
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,8,15