

○食道がん

【FP療法】 インターバル：28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
シスプラチン（シスプラチン）	80mg/m ²	点滴静注	Day1
5-FU（フルオロウラシル）	800mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【FP+RT療法】 インターバル：28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
シスプラチン（シスプラチン）	70mg/m ²	点滴静注	Day1
5-FU（フルオロウラシル）	700mg/m ²	点滴静注	Day1-4

【DOC+CDGP療法】 インターバル：14日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル（ドセタキセル）	30mg/m ²	点滴静注	Day1
アクブラ（ネダプラチン）	40mg/m ²	点滴静注	Day1

【tri-weekly DOC療法】 インターバル：21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル（ドセタキセル）	70mg/m ²	点滴静注	Day1

【オブジーボ療法】 インターバル：14日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	Day1

【CDGP+5FU療法】 インターバル：28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アクブラ（ネダプラチン）	90mg/m ²	点滴静注	Day1
5-FU（フルオロウラシル）	800mg/m ²	点滴静注	Day1-5