

○尿路上皮がん

【MVAC 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
メソトレキサート（メソトレキセート）	30mg/m ²	点滴静注	Day1,15,22
エクザール（ビンブラスチン）	3mg/m ²	点滴静注	Day2,15,22
アドリアシン（ドキシソルピシン）	30mg/m ²	点滴静注	Day2
シスプラチン（シスプラチン）	70mg/m ²	点滴静注	Day2

【GEM 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15

【TC 療法】 インターバル：21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル（パクリタキセル）	175mg/m ²	点滴静注	Day1
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC=5	点滴静注	Day1

【GEM + CBDCA 療法】 インターバル：21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC=5	点滴静注	Day1

【Dose-Dense MVAC 療法】 インターバル：14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
メソトレキサート（メソトレキセート）	30mg/m ²	点滴静注	Day1
エクザール（ビンブラスチン）	3mg/m ²	点滴静注	Day2
アドリアシン（ドキシソルピシン）	30mg/m ²	点滴静注	Day2
シスプラチン（シスプラチン）	70mg/m ²	点滴静注	Day2

【キイトルーダ療法】 インターバル：21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペンブロリズマブ）	200mg/body	点滴静注	Day1

【DOC 療法】 インターバル：21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル（ドセタキセル）	70mg/m ²	点滴静注	Day1

【GC療法】 インターバル：28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15
シスプラチン（シスプラチン）	70mg/m ²	点滴静注	Day2