

○ホジキンリンパ腫

【ABVd 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エクザール（ビンブラスチン）	6mg/m ²	点滴静注	Day1,15
アドリアシン（ドキソルビシン）	25mg/m ²	点滴静注	Day1,15
ブレオ（ブレオマイシン）	10mg/m ²	点滴静注	Day1,15
ダカルバジン（ダカルバジン）	250mg/m ²	点滴静注	Day1,15

【ABVD 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エクザール（ビンブラスチン）	6mg/m ²	点滴静注	Day1,15
アドリアシン（ドキソルビシン）	25mg/m ²	点滴静注	Day1,15
ブレオ（ブレオマイシン）	9mg/m ²	点滴静注	Day1,15
ダカルバジン（ダカルバジン）	375mg/m ²	点滴静注	Day1,15

【アドセトリス+AVD 療法】 インターバル：28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エクザール（ビンブラスチン）	6mg/m ²	点滴静注	Day1,15
アドリアシン（ドキソルビシン）	25mg/m ²	点滴静注	Day1,15
ダカルバジン（ダカルバジン）	375mg/m ²	点滴静注	Day1,15
アドセトリス（ブレンツキシマブ ベドチン）	1.2mg/kg	点滴静注	Day1,15