

経腸栄養剤に関連する 機能性食品

経管 エンジヨイ プロテイン	たんぱく質を補充したい方
グルタミンF	下痢に困難している方、腸管粘膜が弱っている方
トロメイク	逆流・下痢に配慮:水分、リーナレン、エンシユアなどにトロミ
キャロラクト	便秘・便秘に配慮:乳酸菌・食物繊維含有
ブイクレス	高ビタミン・ミネラル、コラーゲンペプチド
アバント	創傷治癒・筋肉再生:アミノ酸付加
REF-P1	細いNGチューブでトロミをつける場合:栄養剤を胃内でトロミ
経口 大豆スープ	甘くない栄養食品。鶏ガラ風味200kcal/個、乳アレルギー可能
アイオールソフト	食べる栄養食品。豆乳ベースの甘くないプリンに4種のソース
メイバランス	甘いのが苦手な方への栄養食品。コーンスープ風味200kcal

その他いろいろ

栄養剤

経腸栄養剤



関連食品




REF-P1 (レピ°-ワン)



トロミをつけて
逆流や下痢に配慮

トロメイク



- ・本品投与後300~400mlの栄養剤を1時間以内に入れると胃内でトロミが付

【注意点】

- ・3包投与すると水分量は約+270ml
→水分制限が必要な場合は注意
- ・当院では処方エンシュアリキットでトロミがつかない
→トロメイクで代替
- ・白湯を同時に利用すると栄養剤濃度が薄くなり、トロミが弱くなる
→投与前か後に約30分間隔を空ける
or眠前等にまとめて白湯を投与
- ・少ない栄養剤の量(100~200ml)でも固くなりすぎることはない

- ・投与直前に栄養剤100mLに1包入れてショット投与
※混ぜてから時間が経過すると固まりすぎてしまい投与困難に
- ・REF-P1の効果が足りない場合はトロメイクを使用

逆流のリスクが高い患者の場合、
キャララクト等も含めた投与手順目安
白湯、キャララクト等
↓
30分後REF-P1
↓
栄養剤(1hr以内)

※胃排出時間が、水分の方が短く、経腸栄養剤の方が長い

経腸栄養剤に関連する機能性食品

グルタミンF



絶食が長期
など腸管粘膜を
整えたい時

- ・水100～150mlに溶く
オリゴ糖が入っておらず下痢
しにくいと言われている

キャロラクトF



下痢、便秘が
ある方に配慮

- ・水30～40mlに溶いて
ワンショットで注入
- ・栄養剤と混合は避ける
- ・栄養剤の投与前でも後でも
どちらでも可能

アバンド



創傷治癒や
筋肉再生を
サポート

- ・240～300mL (最低
120mL)の水に溶かす
- ・栄養剤と混合は避ける

メイバランス



甘いものが
苦手な方にも

- ・200kcal/125ml(1ケ)
蛋白質7.5g 脂質5.6g
- ・エネルギー構成比
(NPC/N 145)
PFC比 = 1 5 : 2 5 : 6 0

大豆スープ



- ・200kcal/100ml(1ケ)
蛋白質4.7g 脂質14.3g
- ・エネルギー構成比
(NPC/N 315)
PFC比 = 9 : 6 4 : 2 6

ブイクレス



褥瘡や食欲不振
の方に

- ・80kcal/125ml(1ケ)
蛋白質12.0g 脂質0g
亜鉛12mg、鉄5mg

経腸栄養剤に関連する機能的食品

アイオールソフト

食事がすすまない方に

- 160kcal+ソース40-50kcal
蛋白質8g 補給
- 4種類のソース
黒蜜、みたらし、銀あん、てりやき



リハたいむゼリー

リハビリの効果を高めたい方に



1. 100kcal/120g
2. たんぱく質10g
うちBCAA2500mg (ロイシン1400mg)
3. ビタミンD800IU (20μg)
4. シイクワシャー抽出物 10mg

エネビットゼリー

腎機能に配慮



1. 200kcal
2. たんぱく質0g