

気持ちが悪い

吐き気止め

吐き気止めを飲んでいますか？

はい

いいえ

いつ飲んでいますか？

吐き気止めを飲みましょう

気持ちが悪
い時だけ

食後

定期的に服用

1日 () 回
定期的に
飲みましょう

食前に変えて
みましょう

便は出ていますか？

はい

いいえ

新しい痛み止めを飲み始めてから
2週間以上たっていますか？

「便がでない」の
フローチャートへ

はい

いいえ

便秘による吐き気の
可能性があります

主治医、薬剤師に相談して
下さい。薬剤の減量・変更が
必要な場合があります。

徐々によくなることが多いですが、
続く場合は主治医、薬剤師に
相談して下さい。

便が出ない

下剤

下剤を飲んでいますか？

はい

いいえ

いつ飲んでいますか？

下剤を飲みましょう

1日に2~3回
定期的に服用

便が出ない時だけ

（ 頓用の下剤 ）は
飲んでいますか？

1日 回
（ ）を
定期的に飲みましょう。

はい

いいえ

頓用の下剤の量を
増やしてみましょう。

頓用の下剤も
飲みましょう

変わらない

主治医、薬剤師に相談して下さい。
下剤の変更や痛み止めの減量・
変更が必要な場合があります。

⚠️便秘に加えガスが出ない・吐き気・
嘔吐・腹痛などの症状がある場合は
ご連絡ください。

※食事量が少ない場合は排便も
少なくなります。

痛みがとれない

新しい痛み止め（ ）を飲んでいますか？

はい

いいえ

前から飲んでいる痛み止め（ ）も飲んでいますか？

新しい痛み止めを
飲みましょう

はい

いいえ

新しい痛み止めは決められた時間に
飲んでいますか？

（ ）も
飲みましょう

はい

いいえ

早く効く痛み止め
(レスキュー：)を
飲んでいますか？

決められた時間に
飲みましょう

はい

いいえ

早く効く痛み止めを飲むことを
我慢していますか？

痛いときに飲みましょう

はい

いいえ

早く効く痛み止め
(レスキュー)の
使い方のページへ

主治医、薬剤師に相談して下さい。
薬剤の増量・変更などを考えます。

お薬の相談はお気軽にどうぞ。
TEL 052-832-1121 内線65401

早く効く痛み止め (レスキュー) の使い

レスキュー

いつ飲むの？

「痛くなりそう」「痛い」と思ったら飲みましょう。痛みが小さいうちに**我慢しないで**飲むことがポイントです。体を動かすと痛い場合は、動く前に、あるいは痛み止めを飲む前に痛みが出る場合はその前に、**予防的**に飲むことも効果的です。

何回まで飲んでいいの？

原則、何回までという**限度はありません**。

(医師から回数の指示がある場合は指示に従ってください。)
飲み薬の場合は1時間、坐薬の場合は2時間あければ使って問題ありません。

たくさん飲んでも大丈夫？

痛みがある時は飲んで大丈夫です。レスキューの使用回数によって他の痛み止めの量も調節していきます。飲んだ時間・回数を主治医・薬剤師にお伝えください。