

精巣腫瘍

【BEP療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ブレオ（ブレオマイシン）	30mg/m ²	点滴静注	Day2,9,16
エトポシド（エトポシド）	100mg/m ²	点滴静注	Day1-5
シスプラチン（シスプラチン）	20mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【EP療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エトポシド（エトポシド）	100mg/m ²	点滴静注	Day1-5
シスプラチン（シスプラチン）	20mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【VIP療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エトポシド（エトポシド）	75mg/m ²	点滴静注	Day1-5
イホマイド（イホスファミド）	1200mg/m ²	点滴静注	Day1-5
シスプラチン（シスプラチン）	20mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【VeIP療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エクザール（ビンブラスチン）	0.11mg/kg	点滴静注	Day1,2
イホマイド（イホスファミド）	1200mg/m ²	点滴静注	Day1-5
シスプラチン（シスプラチン）	20mg/m ²	点滴静注	Day1-5

【CBDCA単回療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC=7	点滴静注	Day1

【TIP療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル（パクリタキセル）	175mg/m ²	点滴静注	Day1
イホマイド（イホスファミド）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1-5
シスプラチン（シスプラチン）	20mg/m ²	点滴静注	Day1-5