

軟部肉腫

【AI療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アドリアシン（ドキシソルビシン）	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,2
イホマイド（イホスファミド）	2000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1-5

【アドリアシン療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アドリアシン（ドキシソルビシン）	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1

【パクリタキセル療法】 インターバル： 28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
パクリタキセル（パクリタキセル）	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,8,15

【DG療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ドセタキセル（ドセタキセル）	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day8
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	900mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,8

【エリブリン療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ハラヴェン（エリブリン）	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1,8

【トラベクテジン療法】 インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ヨンデリス（トラベクテジン）	1.2mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day1