

胆道がん

【GC療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8
シスプラチン（シスプラチン）	25mg/m ²	点滴静注	Day1,8

【GEM療法】 インターバル 28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15

【イミフィンジ+GC療法】 インターバル 21日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ（デュルバルマブ）	1500mg/day (30kg以下は20mg/kg)	点滴静注	Day1
シスプラチン（シスプラチン）	25mg/m ²	点滴静注	Day1,8
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8

【イミフィンジ療法】 インターバル 28日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ（デュルバルマブ）	1500mg/day (30kg以下は20mg/kg)	点滴静注	Day1

【GCS療法】 インターバル 14日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
シスプラチン（シスプラチン）	25mg/m ²	点滴静注	Day1
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1
S-1（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム）	80-120mg/day	経口分2	Day1-7

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日