

腎がん

【オブジーボ療法】

インターバル： 14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	Day1

【オブジーボ+ヤーボイ療法】

インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	Day1
ヤーボイ（イピリムマブ）	1mg/kg	点滴静注	Day1

【バベンチオ+インライタ療法】

インターバル： 14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
バベンチオ(アベルマブ)	10mg/kg	点滴静注	day1
インライタ(アキシチニブ)	10mg/day	経口分2	day1-14

【オブジーボ+カボメティクス療法】

インターバル： 14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オブジーボ（ニボルマブ）	240mg/body	点滴静注	day1
カボメティクス(カボザンチニブ)	40mg/day	経口分1	day1-14

【キイトルーダ+レンビマ療法】

インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペムブロリズマブ）	200mg/body	点滴静注	day1
レンビマ（レンバチニブメシル酸塩）	20mg/day	経口分1	day1-21

【キイトルーダ+インライタ療法】

インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペムブロリズマブ）	200mg/body	点滴静注	Day1
インライタ（アキシチニブ）	10mg/day	経口分1	Day1-21

【キイトルーダ+インライタ療法】(6週サイクル)

インターバル： 42 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペムブロリズマブ）	400mg/body	点滴静注	day1
インライタ（アキシチニブ）	10mg/day	経口分2	day1-42

【キイトルーダ療法】(術後療法)

インターバル： 21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ（ペムブロリズマブ）	200mg/body	点滴静注	day1

【インライタ療法】 インターバル： 28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
インライタ（アキシチニブ）	10mg/day	経口分2	Day1-28

【カボメティクス療法】 インターバル： 28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
カボメティクス(カボザンチニブ)	60mg/day	経口分1	day1-28

【ヴォトリエント療法】 インターバル： 28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ヴォトリエント（パゾパニブ）	800mg/day	経口分1	Day1-28

【スーテント療法】 インターバル： 42日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
スーテント（スニチニブ）	50mg/day	経口分1	Day1-28

【ネクサバール療法】 インターバル： 28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ネクサバール（ソラフェニブ）	800mg/day	経口分2	Day1-28

【アフィニトール療法】 インターバル： 28日（連日）

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アフィニトール（エベロリムス）	10mg/body	経口分1	Day1-28

【トーリセル単剤療法】 インターバル： 7日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
トーリセル（テムシロリムス）	25mg/body	点滴静注	day1