

膵がん

【mFOLFIRINOX療法】

インターバル

14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
エルプラット（オキサリプラチン）	85mg/m ²	点滴静注	Day1
レボホリナート（レボホリナート）	200mg/m ²	点滴静注	Day1
イリノテカン（イリノテカン）	150mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	2400mg/m ²	持続静注	Day1

【nab-PAC + GEM療法】

インターバル

28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
アブラキサン（アルブミン懸濁型パクリタキセル）	125mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15

【FF+オニバイド療法】

インターバル

14 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
オニバイド（イリノテカン リポソーム製剤）	70mg/m ²	点滴静注	Day1
レボホリナート（レボホリナート）	200mg/m ²	点滴静注	Day1
フルオロウラシル（フルオロウラシル）	2400mg/m ²	持続静注	Day1

【GEM療法】

インターバル

28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15

【S-1 + GEM療法】

インターバル

21 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8
S-1（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム）	80-120mg/day	経口分2	Day1-14

【GEM + タルセバ療法】

インターバル

28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	点滴静注	Day1,8,15
タルセバ（エルロチニブ）	100mg/day	経口分1	Day1-28

【リムパーザ療法】

インターバル

28 日

薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与日
リムパーザ（オラパリブ）	600mg/body	経口分2	Day1-28