

当院採用栄養剤に対するとろみアップパーフェクト使用量目安

段階基準(cc)
 薄いとろみ:2.2-7.0
 中間とろみ:7.0-9.5

※とろみアップパーフェクト1包1g

栄養剤の分類		当院採用栄養剤	栄養剤1本当たりの容量(ml)	とろみ剤必要目安量(g)	シリンジ法による残留量(cc)
成分	【処方】	エレンタール	300 (1包を水で希釈)	3-4.5	5.0-6.8
消化態	【食品】	ペプチーノ	200	2	2.8
半消化態	【処方】	ラコールNF	200	2	3.0
			400	4	未実施
		エンシュア・H	250	3	5.5
		エネーボ	250	3	7.0
	【食品】	CZ-Hi	200	2	3.0
		テルミール	200	2	5.0
		リーナレン	250	3	7.2
		グルセルナ-REX	200	3	7.0
		メイバランス	100	1	4.6
		大豆スープ	100	1	8.4
		アバンド	300 (1包を水で希釈)	4	6.9
		グルタミンF	300 (1包を水で希釈)	3	2.2(攪拌直後)
		イノラス(ヨーグルト)	185 (1包を水で希釈)	2	5.0
		ブイクレス	125	2	8.0
		ペプタメンAF	200	2	7.0
ラクフィア	200	2	4.0		